je viens rendre compte à l'Académie d'une observation sur d'un placenta implanté sur toute la circonférence de l'orifice interne de la matrice, envoyé par mr Brescarode chirurgien à Bayonne

Mr Brescarode appellé pour secourir une femme grosse de neuf mois révolus, attaquée d'une perte considérable et éprouvant des douleurs qui annonçoient un accouchement prochain, voulut se mettre en devoir de lui aider. Mais ce fut en vain. Ses offres ne furent acceptés que trois jours ~~après~~ après. lorsqu'il voulut procéder à l'accouchement il fut très surpris de ne pouvoir entrer dans la matrice, quoique son orifice fut dilaté de la largeur d'un écu de six livres. Un corps charnu qu'il trouva à l'entrée s'y opposoit; il jugea que ce pouvoit être le placenta qui au lieu d'être attaché au fonds ou aux parois de la matrice, l'étoit à son orifice. il se mit à en détacher seulement ce qui étoit nécessaire pour l'introduction de sa main, saisit un pied de l'enfant et termina l'accouchement. La mere expira dans le moment et l'enfant ne survecut que peu de tems. Mr Brescarode attribue la mort de l'un & de l'autre à la grande quantité de sang que le décollement du placenta avoit laissé échaper pendant les trois jours qui se passerent sans qu'on eut recours à luy. il croit avec raison que si on lui eut laissé terminer l'accouchement le premier jour qu'il fut appellé, il eut pu sauver la mere & l'enfant. il est malheureux pour l'un et pour l'autre qu'on n'ait pas adheré aux conseils de Mr Brescarode qui avoit saisi la vraie indication. ~~Cette~~

Cette observation n'est pas aussi rare que Mr Brescarode le pense, plusieurs auteurs modernes en parlent. les placenta détachés avant la sortie de l'enfant dont Guillemeau & mauriceau parlent paroissent être des placenta qui étoient adherens à l'orifice. je crois que cette observation peut être utile à servir pour nos mémoires qui auront trait à cette matiere.

Guyenot ce 20 may 1754

ARC 18 d. 6 n° 102